

表 1502 降圧薬使用の有無 透析前アルブミン濃度(g/dL)別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

透析前アルブミン 濃度	なし	あり	合計	不明	記載なし	総計
1.5未満 (%)	73 (57.5)	54 (42.5)	127 (100.0)	2	17	146
1.5～ (%)	358 (53.8)	307 (46.2)	665 (100.0)	6	100	771
2.0～ (%)	1,382 (50.1)	1,377 (49.9)	2,759 (100.0)	16	404	3,179
2.5～ (%)	4,665 (44.3)	5,857 (55.7)	10,522 (100.0)	87	1,541	12,150
3.0～ (%)	16,880 (37.2)	28,532 (62.8)	45,412 (100.0)	234	6,436	52,082
3.5～ (%)	28,809 (30.8)	64,743 (69.2)	93,552 (100.0)	387	13,196	107,135
4.0～ (%)	9,058 (25.7)	26,246 (74.3)	35,304 (100.0)	127	5,075	40,506
4.5～ (%)	466 (22.6)	1,592 (77.4)	2,058 (100.0)	3	301	2,362
5.0～ (%)	45 (31.5)	98 (68.5)	143 (100.0)		29	172
合計 (%)	61,736 (32.4)	128,806 (67.6)	190,542 (100.0)	862	27,099	218,503
記載なし (%)	1,630 (29.9)	3,830 (70.1)	5,460 (100.0)	61	4,947	10,468
総計 (%)	63,366 (32.3)	132,636 (67.7)	196,002 (100.0)	923	32,046	228,971
平均	3.52	3.64	3.60	3.49	3.60	3.60
標準偏差	0.47	0.42	0.44	0.48	0.45	0.44

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査