

表 1503 降圧薬使用の有無 透析前CRP濃度(mg/dL)別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

透析前CRP濃度	なし	あり	合計	不明	記載なし	総計
0.2未満 (%)	27,000 (29.2)	65,556 (70.8)	92,556 (100.0)	446	12,527	105,529
0.2～ (%)	10,540 (33.9)	20,592 (66.1)	31,132 (100.0)	155	4,091	35,378
0.5～ (%)	5,732 (36.2)	10,095 (63.8)	15,827 (100.0)	84	2,236	18,147
1.0～ (%)	3,897 (37.7)	6,441 (62.3)	10,338 (100.0)	61	1,373	11,772
2.0～ (%)	2,527 (40.0)	3,783 (60.0)	6,310 (100.0)	35	909	7,254
4.0～ (%)	902 (40.2)	1,342 (59.8)	2,244 (100.0)	24	314	2,582
6.0～ (%)	477 (42.5)	646 (57.5)	1,123 (100.0)	6	153	1,282
8.0～ (%)	256 (43.2)	337 (56.8)	593 (100.0)	8	93	694
10.0～ (%)	330 (44.8)	407 (55.2)	737 (100.0)	5	100	842
15.0～ (%)	196 (41.4)	277 (58.6)	473 (100.0)	8	79	560
合計 (%)	51,857 (32.1)	109,476 (67.9)	161,333 (100.0)	832	21,875	184,040
記載なし (%)	11,509 (33.2)	23,160 (66.8)	34,669 (100.0)	91	10,171	44,931
総計 (%)	63,366 (32.3)	132,636 (67.7)	196,002 (100.0)	923	32,046	228,971
平均	0.78	0.58	0.64	0.93	0.66	0.64
標準偏差	2.19	1.81	1.94	2.62	1.90	1.94

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する％です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査