

表 1506 降圧薬使用の有無 PTH値(pg/mL)別（施設血液透析患者 透析回数週3回）PTH測定法:intact-PTH

PTH値	なし	あり	合計	不明	記載なし	総計
20未満 (%)	2,928 (34.9)	5,450 (65.1)	8,378 (100.0)	27	1,107	9,512
20～ (%)	3,981 (32.8)	8,143 (67.2)	12,124 (100.0)	35	1,570	13,729
40～ (%)	4,098 (32.1)	8,671 (67.9)	12,769 (100.0)	52	1,704	14,525
60～ (%)	4,352 (31.7)	9,364 (68.3)	13,716 (100.0)	55	1,743	15,514
80～ (%)	4,266 (31.1)	9,460 (68.9)	13,726 (100.0)	73	1,872	15,671
100～ (%)	4,265 (31.9)	9,111 (68.1)	13,376 (100.0)	66	1,829	15,271
120～ (%)	3,995 (31.4)	8,727 (68.6)	12,722 (100.0)	70	1,794	14,586
140～ (%)	3,650 (31.1)	8,086 (68.9)	11,736 (100.0)	46	1,721	13,503
160～ (%)	3,286 (31.2)	7,258 (68.8)	10,544 (100.0)	52	1,511	12,107
180～ (%)	7,566 (31.8)	16,255 (68.2)	23,821 (100.0)	102	3,505	27,428
240～ (%)	94 (32.2)	198 (67.8)	292 (100.0)	1	45	338
241～ (%)	4,284 (31.6)	9,271 (68.4)	13,555 (100.0)	57	1,986	15,598
300～ (%)	2,524 (32.3)	5,299 (67.7)	7,823 (100.0)	30	1,139	8,992
360～ (%)	1,516 (33.7)	2,977 (66.3)	4,493 (100.0)	14	617	5,124
420～ (%)	937 (35.4)	1,709 (64.6)	2,646 (100.0)	7	371	3,024
480～ (%)	230 (36.1)	407 (63.9)	637 (100.0)	5	94	736
500～ (%)	361 (34.7)	678 (65.3)	1,039 (100.0)	6	144	1,189
540～ (%)	421 (37.3)	708 (62.7)	1,129 (100.0)	2	179	1,310
600～ (%)	683 (36.7)	1,180 (63.3)	1,863 (100.0)	4	265	2,132
800～ (%)	606 (42.1)	833 (57.9)	1,439 (100.0)	3	180	1,622
合計 (%)	54,043 (32.2)	113,785 (67.8)	167,828 (100.0)	707	23,376	191,911
記載なし (%)	1,121 (33.4)	2,233 (66.6)	3,354 (100.0)	29	1,292	4,675
総計 (%)	55,164 (32.2)	116,018 (67.8)	171,182 (100.0)	736	24,668	196,586
平均	174.29	167.48	169.67	160.77	172.39	169.97
標準偏差	178.45	153.15	161.76	126.69	156.09	160.97

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査