

表 1509 降圧薬使用の有無 総コレステロール濃度(mg/dL)別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

総コレステロール 濃度	なし	あり	合計	不明	記載なし	総計
100未満 (%)	1,886 (33.7)	3,707 (66.3)	5,593 (100.0)	34	827	6,454
100～ (%)	5,005 (30.7)	11,282 (69.3)	16,287 (100.0)	78	2,255	18,620
120～ (%)	9,210 (30.8)	20,735 (69.2)	29,945 (100.0)	148	4,222	34,315
140～ (%)	10,426 (30.8)	23,416 (69.2)	33,842 (100.0)	161	4,823	38,826
160～ (%)	8,764 (31.8)	18,805 (68.2)	27,569 (100.0)	121	3,893	31,583
180～ (%)	5,636 (32.9)	11,477 (67.1)	17,113 (100.0)	42	2,464	19,619
200～ (%)	3,039 (34.2)	5,847 (65.8)	8,886 (100.0)	32	1,291	10,209
220～ (%)	1,377 (35.6)	2,490 (64.4)	3,867 (100.0)	13	595	4,475
240～ (%)	508 (33.7)	998 (66.3)	1,506 (100.0)	8	219	1,733
260～ (%)	354 (37.5)	589 (62.5)	943 (100.0)	5	163	1,111
合計 (%)	46,205 (31.7)	99,346 (68.3)	145,551 (100.0)	642	20,752	166,945
記載なし (%)	17,161 (34.0)	33,290 (66.0)	50,451 (100.0)	281	11,294	62,026
総計 (%)	63,366 (32.3)	132,636 (67.7)	196,002 (100.0)	923	32,046	228,971
平均	155.69	154.17	154.65	150.23	155.28	154.71
標準偏差	36.04	34.76	35.18	34.91	36.01	35.28

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査