

表 1511 降圧薬使用の有無 Non-HDL-C濃度(mg/dL)別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

Non-HDL-C濃度	なし	あり	合計	不明	記載なし	総計
50未満 (%)	764 (32.3)	1,598 (67.7)	2,362 (100.0)	7	347	2,716
50～ (%)	3,386 (30.0)	7,919 (70.0)	11,305 (100.0)	37	1,564	12,906
70～ (%)	7,561 (30.2)	17,438 (69.8)	24,999 (100.0)	79	3,454	28,532
90～ (%)	9,217 (31.3)	20,266 (68.7)	29,483 (100.0)	71	4,025	33,579
110～ (%)	7,564 (32.1)	15,979 (67.9)	23,543 (100.0)	47	3,089	26,679
130～ (%)	4,762 (33.6)	9,417 (66.4)	14,179 (100.0)	29	1,925	16,133
150～ (%)	2,392 (33.8)	4,690 (66.2)	7,082 (100.0)	10	951	8,043
170～ (%)	1,085 (34.5)	2,058 (65.5)	3,143 (100.0)	1	423	3,567
190～ (%)	419 (35.0)	779 (65.0)	1,198 (100.0)	2	138	1,338
210～ (%)	260 (37.0)	442 (63.0)	702 (100.0)	2	128	832
合計 (%)	37,410 (31.7)	80,586 (68.3)	117,996 (100.0)	285	16,044	134,325
記載なし (%)	25,956 (33.3)	52,050 (66.7)	78,006 (100.0)	638	16,002	94,646
総計 (%)	63,366 (32.3)	132,636 (67.7)	196,002 (100.0)	923	32,046	228,971
平均	107.86	105.84	106.48	98.58	106.21	106.43
標準偏差	33.81	32.95	33.24	30.18	33.91	33.32

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査