

表 1512 降圧薬使用の有無 透析前収縮期血圧(mmHg)別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

透析前収縮期血圧	なし	あり	合計	不明	記載なし	総計
60未満	18	9	27		8	35
(%)	(66.7)	(33.3)	(100.0)			
60～	169	59	228	2	41	271
(%)	(74.1)	(25.9)	(100.0)			
80～	1,408	648	2,056	16	305	2,377
(%)	(68.5)	(31.5)	(100.0)			
100～	6,028	5,472	11,500	65	1,590	13,155
(%)	(52.4)	(47.6)	(100.0)			
120～	14,138	22,531	36,669	146	4,761	41,576
(%)	(38.6)	(61.4)	(100.0)			
140～	17,006	39,823	56,829	255	7,119	64,203
(%)	(29.9)	(70.1)	(100.0)			
160～	10,689	30,719	41,408	166	5,269	46,843
(%)	(25.8)	(74.2)	(100.0)			
180～	3,689	12,234	15,923	65	2,014	18,002
(%)	(23.2)	(76.8)	(100.0)			
200～	852	3,167	4,019	16	480	4,515
(%)	(21.2)	(78.8)	(100.0)			
220～	163	627	790	1	103	894
(%)	(20.6)	(79.4)	(100.0)			
合計	54,160	115,289	169,449	732	21,690	191,871
(%)	(32.0)	(68.0)	(100.0)			
記載なし	9,206	17,347	26,553	191	10,356	37,100
(%)	(34.7)	(65.3)	(100.0)			
総計	63,366	132,636	196,002	923	32,046	228,971
(%)	(32.3)	(67.7)	(100.0)			
平均	145.52	154.62	151.71	149.37	151.16	151.64
標準偏差	24.87	22.96	23.97	24.54	24.37	24.02

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査