

表 1513 降圧薬使用の有無 透析前拡張期血圧(mmHg)別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

透析前拡張 期血圧	なし	あり	合計	不明	記載なし	総計
20未満 (%)	20 (35.7)	36 (64.3)	56 (100.0)		11	67
20～ (%)	303 (58.5)	215 (41.5)	518 (100.0)	4	90	612
40～ (%)	5,952 (41.6)	8,358 (58.4)	14,310 (100.0)	62	1,985	16,357
60～ (%)	25,965 (32.7)	53,323 (67.3)	79,288 (100.0)	360	9,977	89,625
80～ (%)	12,371 (29.9)	29,044 (70.1)	41,415 (100.0)	173	5,252	46,840
90～ (%)	6,304 (28.6)	15,702 (71.4)	22,006 (100.0)	85	2,857	24,948
100～ (%)	2,897 (27.1)	7,799 (72.9)	10,696 (100.0)	43	1,403	12,142
120～ (%)	160 (23.9)	510 (76.1)	670 (100.0)	4	67	741
140～ (%)	19 (38.0)	31 (62.0)	50 (100.0)		7	57
合計 (%)	53,991 (31.9)	115,018 (68.1)	169,009 (100.0)	731	21,649	191,389
記載なし (%)	9,375 (34.7)	17,618 (65.3)	26,993 (100.0)	192	10,397	37,582
総計 (%)	63,366 (32.3)	132,636 (67.7)	196,002 (100.0)	923	32,046	228,971
平均	75.95	78.33	77.57	76.78	77.51	77.56
標準偏差	14.66	14.15	14.36	14.63	14.60	14.39

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査