

表 1516 降圧薬使用の有無 年齢(歳)別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回)

年齢	なし	あり	合計	不明	記載なし	総計
15歳未満 (%)		2 (100.0)	2 (100.0)			2
15歳～ (%)	41 (29.9)	96 (70.1)	137 (100.0)	1	24	162
30歳～ (%)	700 (32.2)	1,477 (67.8)	2,177 (100.0)	4	307	2,488
45歳～ (%)	2,574 (32.4)	5,366 (67.6)	7,940 (100.0)	21	1,212	9,173
60歳～ (%)	5,570 (34.1)	10,788 (65.9)	16,358 (100.0)	46	2,610	19,014
75歳～ (%)	2,728 (36.6)	4,734 (63.4)	7,462 (100.0)	22	1,270	8,754
90歳～ (%)	135 (46.6)	155 (53.4)	290 (100.0)	2	58	350
合計 (%)	11,748 (34.2)	22,618 (65.8)	34,366 (100.0)	96	5,481	39,943
不明 (%)		1 (100.0)	1 (100.0)		2	3
記載なし (%)						
総計 (%)	11,748 (34.2)	22,619 (65.8)	34,367 (100.0)	96	5,483	39,946
平均	65.49	64.56	64.88	65.52	65.57	64.98
標準偏差	12.50	12.31	12.38	12.90	12.29	12.38

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査