

表 1517 降圧薬使用の有無 透析歴(年)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

透析歴	なし	あり	合計	不明	記載なし	総計
2年未満 (%)	1,241 (29.1)	3,021 (70.9)	4,262 (100.0)	9	693	4,964
2年～ (%)	2,173 (29.0)	5,322 (71.0)	7,495 (100.0)	15	1,105	8,615
5年～ (%)	2,640 (30.4)	6,030 (69.6)	8,670 (100.0)	28	1,418	10,116
10年～ (%)	1,778 (33.2)	3,575 (66.8)	5,353 (100.0)	20	821	6,194
15年～ (%)	1,292 (38.4)	2,075 (61.6)	3,367 (100.0)	9	548	3,924
20年～ (%)	984 (43.8)	1,261 (56.2)	2,245 (100.0)	3	389	2,637
25年～ (%)	700 (49.9)	704 (50.1)	1,404 (100.0)	4	243	1,651
30年～ (%)	531 (55.8)	421 (44.2)	952 (100.0)	6	165	1,123
35年～ (%)	330 (65.0)	178 (35.0)	508 (100.0)	1	78	587
40年～ (%)	76 (72.4)	29 (27.6)	105 (100.0)	1	18	124
合計 (%)	11,745 (34.2)	22,616 (65.8)	34,361 (100.0)	96	5,478	39,935
不明 (%)	3 (50.0)	3 (50.0)	6 (100.0)		5	11
記載なし (%)						
総計 (%)	11,748 (34.2)	22,619 (65.8)	34,367 (100.0)	96	5,483	39,946
平均	11.96	8.96	9.98	11.29	10.25	10.02
標準偏差	10.04	7.97	8.85	9.53	8.98	8.87

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査