

表 1519 降圧薬使用の有無 医療機関別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

医療機関	なし	あり	合計	不明	記載なし	総計
国公立大学	13	24	37		5	42
(%)	(35.1)	(64.9)	(100.0)			
私立大学	74	88	162	2	9	173
(%)	(45.7)	(54.3)	(100.0)			
国立	9	21	30		6	36
(%)	(30.0)	(70.0)	(100.0)			
県市町村立	521	818	1,339		434	1,773
(%)	(38.9)	(61.1)	(100.0)			
社会保険	121	174	295		24	319
(%)	(41.0)	(59.0)	(100.0)			
厚生連	274	513	787	22	204	1,013
(%)	(34.8)	(65.2)	(100.0)			
その他公的	202	376	578	4	112	694
(%)	(34.9)	(65.1)	(100.0)			
私立総合	337	660	997	7	89	1,093
(%)	(33.8)	(66.2)	(100.0)			
私立	3,225	5,271	8,496	23	1,496	10,015
(%)	(38.0)	(62.0)	(100.0)			
私立診療所	6,972	14,674	21,646	38	3,104	24,788
(%)	(32.2)	(67.8)	(100.0)			
総計	11,748	22,619	34,367	96	5,483	39,946
(%)	(34.2)	(65.8)	(100.0)			

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査