

表 1524 降圧薬使用の有無 血流量(ml/分)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

血流量	なし	あり	合計	不明	記載なし	総計
100未満 (%)		1 (100.0)	1 (100.0)			1
100～ (%)	17 (60.7)	11 (39.3)	28 (100.0)		9	37
120～ (%)	40 (47.1)	45 (52.9)	85 (100.0)		9	94
140～ (%)	503 (42.6)	678 (57.4)	1,181 (100.0)	6	155	1,342
160～ (%)	201 (41.0)	289 (59.0)	490 (100.0)	3	85	578
180～ (%)	993 (40.4)	1,463 (59.6)	2,456 (100.0)	7	483	2,946
200～ (%)	4,141 (35.2)	7,629 (64.8)	11,770 (100.0)	31	1,746	13,547
220～ (%)	1,960 (33.6)	3,874 (66.4)	5,834 (100.0)	8	765	6,607
240～ (%)	2,478 (31.5)	5,397 (68.5)	7,875 (100.0)	36	1,216	9,127
260～ (%)	295 (30.4)	674 (69.6)	969 (100.0)	1	108	1,078
280～ (%)	308 (34.2)	593 (65.8)	901 (100.0)		119	1,020
300～ (%)	644 (28.8)	1,594 (71.2)	2,238 (100.0)	3	224	2,465
350～ (%)	87 (28.6)	217 (71.4)	304 (100.0)		41	345
400～ (%)	48 (27.6)	126 (72.4)	174 (100.0)		28	202
合計 (%)	11,715 (34.1)	22,591 (65.9)	34,306 (100.0)	95	4,988	39,389
記載なし (%)	33 (54.1)	28 (45.9)	61 (100.0)	1	495	557
総計 (%)	11,748 (34.2)	22,619 (65.8)	34,367 (100.0)	96	5,483	39,946
平均	221.06	226.37	224.56	218.63	221.67	224.18
標準偏差	40.03	40.62	40.49	35.03	39.38	40.35

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査