

表 1527 降圧薬使用の有無 体重減少量(kg)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

体重減少量	なし	あり	合計	不明	記載なし	総計
0.0未満 (%)	44 (51.2)	42 (48.8)	86 (100.0)		11	97
0.0～ (%)	482 (42.4)	656 (57.6)	1,138 (100.0)	6	176	1,320
1.0～ (%)	2,593 (40.3)	3,834 (59.7)	6,427 (100.0)	13	960	7,400
2.0～ (%)	4,512 (35.1)	8,328 (64.9)	12,840 (100.0)	28	1,786	14,654
3.0～ (%)	2,176 (30.8)	4,881 (69.2)	7,057 (100.0)	10	947	8,014
4.0～ (%)	506 (26.1)	1,430 (73.9)	1,936 (100.0)	6	249	2,191
5.0～ (%)	113 (31.9)	241 (68.1)	354 (100.0)		46	400
6.0～ (%)	16 (30.2)	37 (69.8)	53 (100.0)		6	59
7.0～ (%)	5 (33.3)	10 (66.7)	15 (100.0)		1	16
8.0～ (%)	8 (28.6)	20 (71.4)	28 (100.0)		2	30
合計 (%)	10,455 (34.9)	19,479 (65.1)	29,934 (100.0)	63	4,184	34,181
記載なし (%)	49 (29.7)	116 (70.3)	165 (100.0)	24	601	790
総計 (%)	10,504 (34.9)	19,595 (65.1)	30,099 (100.0)	87	4,785	34,971
平均	2.46	2.64	2.58	2.45	2.52	2.57
標準偏差	1.05	1.02	1.03	1.05	1.04	1.03

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査