

表 1531 降圧薬使用の有無 透析前クレアチニン濃度(mg/dL)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

透析前クレアチニン 濃度	なし	あり	合計	不明	記載なし	総計
2未満 (%)	1 (33.3)	2 (66.7)	3 (100.0)			3
2～ (%)	62 (48.1)	67 (51.9)	129 (100.0)		18	147
4～ (%)	361 (45.2)	438 (54.8)	799 (100.0)	4	115	918
6～ (%)	1,220 (37.5)	2,036 (62.5)	3,256 (100.0)	8	486	3,750
8～ (%)	2,728 (35.6)	4,941 (64.4)	7,669 (100.0)	17	1,061	8,747
10～ (%)	3,024 (33.8)	5,913 (66.2)	8,937 (100.0)	16	1,194	10,147
12～ (%)	1,915 (33.0)	3,886 (67.0)	5,801 (100.0)	14	823	6,638
14～ (%)	839 (34.0)	1,626 (66.0)	2,465 (100.0)	3	352	2,820
16～ (%)	313 (34.9)	584 (65.1)	897 (100.0)	1	150	1,048
合計 (%)	10,463 (34.9)	19,493 (65.1)	29,956 (100.0)	63	4,199	34,218
記載なし (%)	41 (28.7)	102 (71.3)	143 (100.0)	24	586	753
総計 (%)	10,504 (34.9)	19,595 (65.1)	30,099 (100.0)	87	4,785	34,971
平均	10.58	10.79	10.72	10.31	10.74	10.72
標準偏差	2.73	2.60	2.65	2.68	2.72	2.66

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査