

表 1532 降圧薬使用の有無 single pool Kt/V(Kt/Vsp)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

single pool Kt/V (Kt/Vsp)	なし	あり	合計	不明	記載なし	総計
0.4未満 (%)	6 (37.5)	10 (62.5)	16 (100.0)		3	19
0.4～ (%)	9 (52.9)	8 (47.1)	17 (100.0)		2	19
0.6～ (%)	35 (47.3)	39 (52.7)	74 (100.0)		10	84
0.8～ (%)	177 (31.9)	377 (68.1)	554 (100.0)		64	618
1.0～ (%)	761 (30.0)	1,775 (70.0)	2,536 (100.0)	6	374	2,916
1.2～ (%)	2,071 (31.4)	4,516 (68.6)	6,587 (100.0)	15	904	7,506
1.4～ (%)	2,821 (35.6)	5,112 (64.4)	7,933 (100.0)	20	1,019	8,972
1.6～ (%)	2,125 (36.0)	3,774 (64.0)	5,899 (100.0)	13	761	6,673
1.8～ (%)	1,200 (38.3)	1,934 (61.7)	3,134 (100.0)	6	400	3,540
2.0～ (%)	891 (39.2)	1,381 (60.8)	2,272 (100.0)	3	293	2,568
合計 (%)	10,096 (34.8)	18,926 (65.2)	29,022 (100.0)	63	3,830	32,915
記載なし (%)	408 (37.9)	669 (62.1)	1,077 (100.0)	24	955	2,056
総計 (%)	10,504 (34.9)	19,595 (65.1)	30,099 (100.0)	87	4,785	34,971
平均	1.56	1.53	1.54	1.52	1.53	1.54
標準偏差	0.32	0.31	0.31	0.26	0.31	0.31

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査