

表 1533 降圧薬使用の有無 equilibrated Kt/V(eKt/V)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

equilibrated Kt/V (eKt/V)	なし	あり	合計	不明	記載なし	総計
0.4未満 (%)	6 (37.5)	10 (62.5)	16 (100.0)		4	20
0.4～ (%)	19 (51.4)	18 (48.6)	37 (100.0)		7	44
0.6～ (%)	102 (34.2)	196 (65.8)	298 (100.0)		38	336
0.8～ (%)	594 (30.4)	1,358 (69.6)	1,952 (100.0)	4	255	2,211
1.0～ (%)	2,040 (31.1)	4,519 (68.9)	6,559 (100.0)	15	928	7,502
1.2～ (%)	3,129 (34.9)	5,830 (65.1)	8,959 (100.0)	23	1,157	10,139
1.4～ (%)	2,297 (36.5)	3,998 (63.5)	6,295 (100.0)	14	821	7,130
1.6～ (%)	1,153 (38.5)	1,840 (61.5)	2,993 (100.0)	5	374	3,372
1.8～ (%)	453 (39.9)	682 (60.1)	1,135 (100.0)	1	156	1,292
2.0～ (%)	311 (39.1)	484 (60.9)	795 (100.0)	1	94	890
合計 (%)	10,104 (34.8)	18,935 (65.2)	29,039 (100.0)	63	3,834	32,936
記載なし (%)	400 (37.7)	660 (62.3)	1,060 (100.0)	24	951	2,035
総計 (%)	10,504 (34.9)	19,595 (65.1)	30,099 (100.0)	87	4,785	34,971
平均	1.37	1.34	1.35	1.32	1.34	1.35
標準偏差	0.29	0.28	0.29	0.23	0.29	0.29

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査