

表 1534 降圧薬使用の有無 nPCR(g/kg/day)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

nPCR	なし	あり	合計	不明	記載なし	総計
0.4未満	17	19	36		7	43
(%)	(47.2)	(52.8)	(100.0)			
0.4～	377	624	1,001	2	127	1,130
(%)	(37.7)	(62.3)	(100.0)			
0.6～	2,667	5,326	7,993	15	1,065	9,073
(%)	(33.4)	(66.6)	(100.0)			
0.8～	4,572	8,541	13,113	37	1,730	14,880
(%)	(34.9)	(65.1)	(100.0)			
1.0～	2,028	3,732	5,760	8	763	6,531
(%)	(35.2)	(64.8)	(100.0)			
1.2～	408	627	1,035	1	131	1,167
(%)	(39.4)	(60.6)	(100.0)			
1.4～	44	75	119		9	128
(%)	(37.0)	(63.0)	(100.0)			
1.6～	4	7	11		2	13
(%)	(36.4)	(63.6)	(100.0)			
1.8～		1	1			1
(%)		(100.0)	(100.0)			
2.0～		4	4		2	6
(%)		(100.0)	(100.0)			
合計	10,117	18,956	29,073	63	3,836	32,972
(%)	(34.8)	(65.2)	(100.0)			
記載なし	387	639	1,026	24	949	1,999
(%)	(37.7)	(62.3)	(100.0)			
総計	10,504	19,595	30,099	87	4,785	34,971
(%)	(34.9)	(65.1)	(100.0)			
平均	0.89	0.88	0.88	0.86	0.88	0.88
標準偏差	0.17	0.17	0.17	0.14	0.17	0.17

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査