

表 1536 降圧薬使用の有無 透析前アルブミン濃度(g/dL)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

透析前アルブミン 濃度	なし	あり	合計	不明	記載なし	総計
1.5未満 (%)	6 (60.0)	4 (40.0)	10 (100.0)			10
1.5～ (%)	32 (59.3)	22 (40.7)	54 (100.0)	1	7	62
2.0～ (%)	148 (56.7)	113 (43.3)	261 (100.0)	3	30	294
2.5～ (%)	568 (46.8)	645 (53.2)	1,213 (100.0)	4	175	1,392
3.0～ (%)	3,106 (40.3)	4,605 (59.7)	7,711 (100.0)	22	1,074	8,807
3.5～ (%)	5,923 (32.7)	12,170 (67.3)	18,093 (100.0)	33	2,459	20,585
4.0～ (%)	1,778 (28.1)	4,540 (71.9)	6,318 (100.0)	8	832	7,158
4.5～ (%)	53 (18.9)	228 (81.1)	281 (100.0)		36	317
5.0～ (%)	5 (31.3)	11 (68.8)	16 (100.0)		2	18
合計 (%)	11,619 (34.2)	22,338 (65.8)	33,957 (100.0)	71	4,615	38,643
記載なし (%)	129 (31.5)	281 (68.5)	410 (100.0)	25	868	1,303
総計 (%)	11,748 (34.2)	22,619 (65.8)	34,367 (100.0)	96	5,483	39,946
平均	3.57	3.67	3.64	3.45	3.63	3.64
標準偏差	0.41	0.37	0.39	0.49	0.38	0.39

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査