

表 1538 降圧薬使用の有無 透析前補正カルシウム濃度(mg/dL)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

透析前補正 カルシウム濃度	なし	あり	合計	不明	記載なし	総計
7.0未満 (%)	48 (41.0)	69 (59.0)	117 (100.0)	1	42	160
7.0～ (%)	105 (44.5)	131 (55.5)	236 (100.0)		23	259
7.5～ (%)	290 (34.5)	550 (65.5)	840 (100.0)		111	951
8.0～ (%)	824 (32.9)	1,679 (67.1)	2,503 (100.0)	4	361	2,868
8.4～ (%)	225 (31.1)	499 (68.9)	724 (100.0)	2	92	818
8.5～ (%)	2,682 (32.9)	5,463 (67.1)	8,145 (100.0)	20	1,136	9,301
9.0～ (%)	3,477 (34.1)	6,711 (65.9)	10,188 (100.0)	25	1,302	11,515
9.5～ (%)	2,280 (34.1)	4,406 (65.9)	6,686 (100.0)	7	919	7,612
10.0～ (%)	276 (35.2)	509 (64.8)	785 (100.0)		118	903
10.1～ (%)	798 (36.9)	1,365 (63.1)	2,163 (100.0)	10	279	2,452
10.5～ (%)	409 (39.9)	616 (60.1)	1,025 (100.0)	1	144	1,170
11.0～ (%)	119 (34.7)	224 (65.3)	343 (100.0)	1	39	383
11.5～ (%)	48 (40.3)	71 (59.7)	119 (100.0)		13	132
12.0～ (%)	31 (47.0)	35 (53.0)	66 (100.0)		5	71
合計 (%)	11,612 (34.2)	22,328 (65.8)	33,940 (100.0)	71	4,584	38,595
記載なし (%)	136 (31.9)	291 (68.1)	427 (100.0)	25	899	1,351
総計 (%)	11,748 (34.2)	22,619 (65.8)	34,367 (100.0)	96	5,483	39,946
平均	9.21	9.18	9.19	9.17	9.16	9.19
標準偏差	0.76	0.73	0.74	0.84	0.79	0.75

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査