

表 1543 降圧薬使用の有無 総コレステロール濃度(mg/dL)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

総コレステロール 濃度	なし	あり	合計	不明	記載なし	総計
100未満	315	576	891	3	98	992
(%)	(35.4)	(64.6)	(100.0)			
100～	837	1,785	2,622	8	358	2,988
(%)	(31.9)	(68.1)	(100.0)			
120～	1,621	3,388	5,009	8	677	5,694
(%)	(32.4)	(67.6)	(100.0)			
140～	2,051	4,045	6,096	9	800	6,905
(%)	(33.6)	(66.4)	(100.0)			
160～	1,823	3,460	5,283	15	713	6,011
(%)	(34.5)	(65.5)	(100.0)			
180～	1,238	2,151	3,389	6	478	3,873
(%)	(36.5)	(63.5)	(100.0)			
200～	756	1,237	1,993	2	258	2,253
(%)	(37.9)	(62.1)	(100.0)			
220～	309	523	832	2	122	956
(%)	(37.1)	(62.9)	(100.0)			
240～	118	225	343		41	384
(%)	(34.4)	(65.6)	(100.0)			
260～	60	108	168		48	216
(%)	(35.7)	(64.3)	(100.0)			
合計	9,128	17,498	26,626	53	3,593	30,272
(%)	(34.3)	(65.7)	(100.0)			
記載なし	2,620	5,121	7,741	43	1,890	9,674
(%)	(33.8)	(66.2)	(100.0)			
総計	11,748	22,619	34,367	96	5,483	39,946
(%)	(34.2)	(65.8)	(100.0)			
平均	159.27	157.09	157.84	152.04	159.31	158.00
標準偏差	35.93	35.29	35.52	35.57	36.92	35.70

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査