

表 1545 降圧薬使用の有無 Non-HDL-C濃度(mg/dL)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

Non-HDL-C濃度	なし	あり	合計	不明	記載なし	総計
50未満 (%)	159 (34.1)	307 (65.9)	466 (100.0)	1	62	529
50～ (%)	654 (30.9)	1,462 (69.1)	2,116 (100.0)	3	284	2,403
70～ (%)	1,514 (33.4)	3,014 (66.6)	4,528 (100.0)	10	600	5,138
90～ (%)	1,836 (33.3)	3,678 (66.7)	5,514 (100.0)	5	746	6,265
110～ (%)	1,530 (34.0)	2,976 (66.0)	4,506 (100.0)	11	645	5,162
130～ (%)	1,036 (37.5)	1,726 (62.5)	2,762 (100.0)	1	386	3,149
150～ (%)	510 (36.3)	896 (63.7)	1,406 (100.0)	2	189	1,597
170～ (%)	223 (37.4)	373 (62.6)	596 (100.0)		86	682
190～ (%)	67 (30.7)	151 (69.3)	218 (100.0)	1	43	262
210～ (%)	29 (25.2)	86 (74.8)	115 (100.0)		26	141
合計 (%)	7,558 (34.0)	14,669 (66.0)	22,227 (100.0)	34	3,067	25,328
記載なし (%)	4,190 (34.5)	7,950 (65.5)	12,140 (100.0)	62	2,416	14,618
総計 (%)	11,748 (34.2)	22,619 (65.8)	34,367 (100.0)	96	5,483	39,946
平均	108.08	106.35	106.94	103.82	108.46	107.12
標準偏差	33.15	33.24	33.22	31.65	34.46	33.37

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査