

表 1546 降圧薬使用の有無 透析前収縮期血圧(mmHg)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

透析前収縮期血圧	なし	あり	合計	不明	記載なし	総計
60未満	1	1	2			2
(%)	(50.0)	(50.0)	(100.0)			
60～	75	28	103		12	115
(%)	(72.8)	(27.2)	(100.0)			
80～	388	155	543	7	65	615
(%)	(71.5)	(28.5)	(100.0)			
100～	1,444	1,025	2,469	6	325	2,800
(%)	(58.5)	(41.5)	(100.0)			
120～	2,726	4,015	6,741	14	884	7,639
(%)	(40.4)	(59.6)	(100.0)			
140～	3,143	6,941	10,084	18	1,331	11,433
(%)	(31.2)	(68.8)	(100.0)			
160～	1,918	5,359	7,277	10	1,021	8,308
(%)	(26.4)	(73.6)	(100.0)			
180～	645	2,121	2,766	3	385	3,154
(%)	(23.3)	(76.7)	(100.0)			
200～	145	582	727		95	822
(%)	(19.9)	(80.1)	(100.0)			
220～	30	160	190		26	216
(%)	(15.8)	(84.2)	(100.0)			
合計	10,515	20,387	30,902	58	4,144	35,104
(%)	(34.0)	(66.0)	(100.0)			
記載なし	1,233	2,232	3,465	38	1,339	4,842
(%)	(35.6)	(64.4)	(100.0)			
総計	11,748	22,619	34,367	96	5,483	39,946
(%)	(34.2)	(65.8)	(100.0)			
平均	142.92	154.56	150.60	138.43	151.33	150.67
標準偏差	25.76	23.69	25.03	25.73	25.08	25.04

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査