

表 1547 降圧薬使用の有無 透析前拡張期血圧(mmHg)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

透析前拡張 期血圧	なし	あり	合計	不明	記載なし	総計
20未満 (%)	3 (60.0)	2 (40.0)	5 (100.0)		2	7
20～ (%)	70 (69.3)	31 (30.7)	101 (100.0)	2	18	121
40～ (%)	1,132 (47.3)	1,260 (52.7)	2,392 (100.0)	6	282	2,680
60～ (%)	4,747 (36.1)	8,417 (63.9)	13,164 (100.0)	30	1,778	14,972
80～ (%)	2,516 (31.8)	5,390 (68.2)	7,906 (100.0)	10	1,087	9,003
90～ (%)	1,318 (28.1)	3,369 (71.9)	4,687 (100.0)	6	624	5,317
100～ (%)	637 (26.9)	1,733 (73.1)	2,370 (100.0)	4	327	2,701
120～ (%)	35 (23.5)	114 (76.5)	149 (100.0)		20	169
140～ (%)	3 (27.3)	8 (72.7)	11 (100.0)		1	12
合計 (%)	10,461 (34.0)	20,324 (66.0)	30,785 (100.0)	58	4,139	34,982
記載なし (%)	1,287 (35.9)	2,295 (64.1)	3,582 (100.0)	38	1,344	4,964
総計 (%)	11,748 (34.2)	22,619 (65.8)	34,367 (100.0)	96	5,483	39,946
平均	76.72	80.38	79.14	74.02	79.48	79.17
標準偏差	15.01	14.37	14.70	15.24	14.73	14.70

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査