

表 1548 降圧薬使用の有無 透析前脈拍(拍/分)別(血液透析濾過患者 透析回数週3回)

透析前脈拍	なし	あり	合計	不明	記載なし	総計
40未満	8	8	16		1	17
(%)	(50.0)	(50.0)	(100.0)			
40～	90	175	265	1	29	295
(%)	(34.0)	(66.0)	(100.0)			
50～	667	1,629	2,296	5	331	2,632
(%)	(29.1)	(70.9)	(100.0)			
60～	2,309	5,145	7,454	16	1,020	8,490
(%)	(31.0)	(69.0)	(100.0)			
70～	3,106	6,170	9,276	18	1,251	10,545
(%)	(33.5)	(66.5)	(100.0)			
80～	2,175	3,983	6,158	10	895	7,063
(%)	(35.3)	(64.7)	(100.0)			
90～	1,110	1,787	2,897	6	390	3,293
(%)	(38.3)	(61.7)	(100.0)			
100～	376	541	917	1	124	1,042
(%)	(41.0)	(59.0)	(100.0)			
110～	100	133	233	1	27	261
(%)	(42.9)	(57.1)	(100.0)			
120～	46	51	97		9	106
(%)	(47.4)	(52.6)	(100.0)			
合計	9,987	19,622	29,609	58	4,077	33,744
(%)	(33.7)	(66.3)	(100.0)			
記載なし	1,761	2,997	4,758	38	1,406	6,202
(%)	(37.0)	(63.0)	(100.0)			
総計	11,748	22,619	34,367	96	5,483	39,946
(%)	(34.2)	(65.8)	(100.0)			
平均	76.52	74.87	75.43	74.52	75.44	75.43
標準偏差	13.35	12.74	12.97	12.41	12.66	12.93

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査