

表 1550 降圧薬使用の有無 年齢(歳)別 (腹膜透析患者)

年齢	なし	あり	合計	不明	記載なし	総計
15歳未満 (%)	27 (47.4)	30 (52.6)	57 (100.0)		40	97
15歳～ (%)	32 (37.6)	53 (62.4)	85 (100.0)	2	24	111
30歳～ (%)	97 (20.7)	371 (79.3)	468 (100.0)	6	227	701
45歳～ (%)	281 (17.8)	1,296 (82.2)	1,577 (100.0)	17	708	2,302
60歳～ (%)	543 (19.2)	2,286 (80.8)	2,829 (100.0)	29	1,176	4,034
75歳～ (%)	278 (25.6)	808 (74.4)	1,086 (100.0)	17	488	1,591
90歳～ (%)	29 (37.7)	48 (62.3)	77 (100.0)		28	105
合計 (%)	1,287 (20.8)	4,892 (79.2)	6,179 (100.0)	71	2,691	8,941
不明 (%)						
記載なし (%)						
総計 (%)	1,287 (20.8)	4,892 (79.2)	6,179 (100.0)	71	2,691	8,941
平均	62.72	62.53	62.57	63.15	62.14	62.45
標準偏差	16.97	13.57	14.34	14.79	14.96	14.53

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査