

表 1551 降圧薬使用の有無 透析歴(年)別（腹膜透析患者）

透析歴	なし	あり	合計	不明	記載なし	総計
2年未満 (%)	456 (18.3)	2,035 (81.7)	2,491 (100.0)	30	1,079	3,600
2年～ (%)	445 (20.8)	1,699 (79.2)	2,144 (100.0)	34	1,023	3,201
5年～ (%)	264 (22.2)	925 (77.8)	1,189 (100.0)	5	463	1,657
10年～ (%)	74 (29.5)	177 (70.5)	251 (100.0)	2	87	340
15年～ (%)	34 (47.2)	38 (52.8)	72 (100.0)		25	97
20年～ (%)	4 (30.8)	9 (69.2)	13 (100.0)		7	20
25年～ (%)	4 (57.1)	3 (42.9)	7 (100.0)		1	8
30年～ (%)	4 (57.1)	3 (42.9)	7 (100.0)		3	10
35年～ (%)	1 (33.3)	2 (66.7)	3 (100.0)			3
40年～ (%)						
合計 (%)	1,286 (20.8)	4,891 (79.2)	6,177 (100.0)	71	2,688	8,936
不明 (%)	1 (50.0)	1 (50.0)	2 (100.0)		3	5
記載なし (%)						
総計 (%)	1,287 (20.8)	4,892 (79.2)	6,179 (100.0)	71	2,691	8,941
平均	3.82	2.98	3.16	2.21	2.99	3.10
標準偏差	4.47	3.40	3.66	2.34	3.36	3.56

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査