

表 1552 降圧薬使用の有無 原疾患別（腹膜透析患者）

原疾患	なし	あり	合計	不明	記載なし	総計
慢性糸球体腎炎	467	1,706	2,173	13	873	3,059
(%)	(21.5)	(78.5)	(100.0)			
慢性腎盂腎炎	25	50	75		18	93
(%)	(33.3)	(66.7)	(100.0)			
急速進行性糸球体腎炎	11	42	53		21	74
(%)	(20.8)	(79.2)	(100.0)			
妊娠腎/妊娠中毒症	12	17	29		3	32
(%)	(41.4)	(58.6)	(100.0)			
その他の分類不能の腎炎	17	42	59		26	85
(%)	(28.8)	(71.2)	(100.0)			
多発性嚢胞腎	44	122	166	4	73	243
(%)	(26.5)	(73.5)	(100.0)			
腎硬化症	145	610	755	15	313	1,083
(%)	(19.2)	(80.8)	(100.0)			
悪性高血圧	19	55	74		33	107
(%)	(25.7)	(74.3)	(100.0)			
糖尿病性腎症	317	1,536	1,853	31	882	2,766
(%)	(17.1)	(82.9)	(100.0)			
SLE腎炎	7	35	42		20	62
(%)	(16.7)	(83.3)	(100.0)			
アミロイド腎		4	4		5	9
(%)		(100.0)	(100.0)			
痛風腎	5	20	25		8	33
(%)	(20.0)	(80.0)	(100.0)			
先天性代謝異常による腎不全	7	6	13	1	4	18
(%)	(53.8)	(46.2)	(100.0)			
腎・尿路結核	1		1			1
(%)	(100.0)		(100.0)			
腎・尿路結石	3	10	13		3	16
(%)	(23.1)	(76.9)	(100.0)			
腎・尿路腫瘍	4	6	10	1	3	14
(%)	(40.0)	(60.0)	(100.0)			
閉塞性尿路障害	4	12	16		6	22
(%)	(25.0)	(75.0)	(100.0)			
骨髄腫	2	3	5		3	8
(%)	(40.0)	(60.0)	(100.0)			
腎形成不全	28	28	56		20	76
(%)	(50.0)	(50.0)	(100.0)			
不明	124	436	560	5	275	840
(%)	(22.1)	(77.9)	(100.0)			
再導入	8	27	35		16	51
(%)	(22.9)	(77.1)	(100.0)			
その他	37	125	162	1	86	249
(%)	(22.8)	(77.2)	(100.0)			
合計	1,287	4,892	6,179	71	2,691	8,941
(%)	(20.8)	(79.2)	(100.0)			
記載なし						
(%)						
総計	1,287	4,892	6,179	71	2,691	8,941
(%)	(20.8)	(79.2)	(100.0)			

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査