

表 1556 降圧薬使用の有無 身長(cm)別（腹膜透析患者）

身長	なし	あり	合計	不明	記載なし	総計
130未満	24	34	58		4	62
(%)	(41.4)	(58.6)	(100.0)			
130～	1	9	10		1	11
(%)	(10.0)	(90.0)	(100.0)			
135～	16	42	58		4	62
(%)	(27.6)	(72.4)	(100.0)			
140～	53	136	189	2	36	227
(%)	(28.0)	(72.0)	(100.0)			
145～	93	310	403	2	65	470
(%)	(23.1)	(76.9)	(100.0)			
150～	178	572	750	8	109	867
(%)	(23.7)	(76.3)	(100.0)			
155～	196	725	921	10	118	1,049
(%)	(21.3)	(78.7)	(100.0)			
160～	243	898	1,141	8	181	1,330
(%)	(21.3)	(78.7)	(100.0)			
165～	182	854	1,036	18	158	1,212
(%)	(17.6)	(82.4)	(100.0)			
170～	123	650	773	9	122	904
(%)	(15.9)	(84.1)	(100.0)			
175～	56	257	313	4	49	366
(%)	(17.9)	(82.1)	(100.0)			
180～	10	67	77		10	87
(%)	(13.0)	(87.0)	(100.0)			
185～	3	9	12		1	13
(%)	(25.0)	(75.0)	(100.0)			
190～	1	2	3		1	4
(%)	(33.3)	(66.7)	(100.0)			
合計	1,179	4,565	5,744	61	859	6,664
(%)	(20.5)	(79.5)	(100.0)			
記載なし	108	327	435	10	1,832	2,277
(%)	(24.8)	(75.2)	(100.0)			
総計	1,287	4,892	6,179	71	2,691	8,941
(%)	(20.8)	(79.2)	(100.0)			
平均	158.43	161.01	160.48	162.74	160.90	160.56
標準偏差	13.73	11.00	11.66	8.72	11.33	11.59

数値下のかつこ内は行方向の合計に対する％です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査