

表 1557 降圧薬使用の有無 体重(kg)別（腹膜透析患者）

体重	なし	あり	合計	不明	記載なし	総計
20未満	18	20	38			38
(%)	(47.4)	(52.6)	(100.0)			
20～	7	16	23			23
(%)	(30.4)	(69.6)	(100.0)			
30～	74	86	160	1	11	172
(%)	(46.3)	(53.8)	(100.0)			
40～	207	642	849	6	49	904
(%)	(24.4)	(75.6)	(100.0)			
50～	311	1,173	1,484	12	95	1,591
(%)	(21.0)	(79.0)	(100.0)			
60～	250	1,260	1,510	11	95	1,616
(%)	(16.6)	(83.4)	(100.0)			
70～	99	643	742	7	62	811
(%)	(13.3)	(86.7)	(100.0)			
80～	35	239	274	4	20	298
(%)	(12.8)	(87.2)	(100.0)			
90～	14	79	93	1	10	104
(%)	(15.1)	(84.9)	(100.0)			
100～	2	16	18		2	20
(%)	(11.1)	(88.9)	(100.0)			
110～	3	5	8		2	10
(%)	(37.5)	(62.5)	(100.0)			
120～	3	6	9			9
(%)	(33.3)	(66.7)	(100.0)			
合計	1,023	4,185	5,208	42	346	5,596
(%)	(19.6)	(80.4)	(100.0)			
記載なし	264	707	971	29	2,345	3,345
(%)	(27.2)	(72.8)	(100.0)			
総計	1,287	4,892	6,179	71	2,691	8,941
(%)	(20.8)	(79.2)	(100.0)			
平均	56.85	61.51	60.59	63.36	62.69	60.74
標準偏差	15.21	13.41	13.90	13.03	13.76	13.90

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する％です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査