

表 1558 降圧薬使用の有無 Body Mass Index別（腹膜透析患者）

| Body Mass Index | なし     | あり     | 合計      | 不明    | 記載なし  | 総計    |
|-----------------|--------|--------|---------|-------|-------|-------|
| 14未満            | 14     | 12     | 26      |       | 1     | 27    |
| (%)             | (53.8) | (46.2) | (100.0) |       |       |       |
| 14～             | 34     | 34     | 68      | 1     | 2     | 71    |
| (%)             | (50.0) | (50.0) | (100.0) |       |       |       |
| 16～             | 71     | 149    | 220     |       | 8     | 228   |
| (%)             | (32.3) | (67.7) | (100.0) |       |       |       |
| 18～             | 155    | 436    | 591     | 3     | 33    | 627   |
| (%)             | (26.2) | (73.8) | (100.0) |       |       |       |
| 20～             | 243    | 839    | 1,082   | 9     | 49    | 1,140 |
| (%)             | (22.5) | (77.5) | (100.0) |       |       |       |
| 22～             | 199    | 970    | 1,169   | 8     | 84    | 1,261 |
| (%)             | (17.0) | (83.0) | (100.0) |       |       |       |
| 24～             | 121    | 735    | 856     | 7     | 45    | 908   |
| (%)             | (14.1) | (85.9) | (100.0) |       |       |       |
| 26～             | 72     | 447    | 519     | 7     | 35    | 561   |
| (%)             | (13.9) | (86.1) | (100.0) |       |       |       |
| 28～             | 44     | 242    | 286     | 2     | 14    | 302   |
| (%)             | (15.4) | (84.6) | (100.0) |       |       |       |
| 30～             | 34     | 169    | 203     |       | 17    | 220   |
| (%)             | (16.7) | (83.3) | (100.0) |       |       |       |
| 合計              | 987    | 4,033  | 5,020   | 37    | 288   | 5,345 |
| (%)             | (19.7) | (80.3) | (100.0) |       |       |       |
| 記載なし            | 300    | 859    | 1,159   | 34    | 2,403 | 3,596 |
| (%)             | (25.9) | (74.1) | (100.0) |       |       |       |
| 総計              | 1,287  | 4,892  | 6,179   | 71    | 2,691 | 8,941 |
| (%)             | (20.8) | (79.2) | (100.0) |       |       |       |
| 平均              | 22.14  | 23.36  | 23.12   | 23.51 | 23.48 | 23.15 |
| 標準偏差            | 3.82   | 3.50   | 3.60    | 3.11  | 3.59  | 3.60  |

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査