

表 1559 降圧薬使用の有無 BUN(mg/dL)別（腹膜透析患者）

BUN	なし	あり	合計	不明	記載なし	総計
20未満	9	13	22	1	6	29
(%)	(40.9)	(59.1)	(100.0)			
20～	57	116	173	3	7	183
(%)	(32.9)	(67.1)	(100.0)			
30～	158	465	623	12	37	672
(%)	(25.4)	(74.6)	(100.0)			
40～	250	1,050	1,300	9	83	1,392
(%)	(19.2)	(80.8)	(100.0)			
50～	266	1,222	1,488	9	116	1,613
(%)	(17.9)	(82.1)	(100.0)			
60～	186	874	1,060	5	85	1,150
(%)	(17.5)	(82.5)	(100.0)			
70～	89	428	517	3	29	549
(%)	(17.2)	(82.8)	(100.0)			
80～	35	188	223	3	19	245
(%)	(15.7)	(84.3)	(100.0)			
90～	15	68	83	1	5	89
(%)	(18.1)	(81.9)	(100.0)			
100～	11	24	35	1	4	40
(%)	(31.4)	(68.6)	(100.0)			
110～	3	4	7			7
(%)	(42.9)	(57.1)	(100.0)			
120～	2	4	6		1	7
(%)	(33.3)	(66.7)	(100.0)			
合計	1,081	4,456	5,537	47	392	5,976
(%)	(19.5)	(80.5)	(100.0)			
記載なし	206	436	642	24	2,299	2,965
(%)	(32.1)	(67.9)	(100.0)			
総計	1,287	4,892	6,179	71	2,691	8,941
(%)	(20.8)	(79.2)	(100.0)			
平均	52.99	55.34	54.88	50.81	55.71	54.90
標準偏差	16.73	15.53	15.79	19.20	15.77	15.82

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する％です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査