

表 1560 降圧薬使用の有無 クレアチニン濃度(mg/dL)別（腹膜透析患者）

クレアチニン 濃度	なし	あり	合計	不明	記載なし	総計
2未満 (%)	7 (50.0)	7 (50.0)	14 (100.0)		3	17
2～ (%)	48 (35.3)	88 (64.7)	136 (100.0)		18	154
4～ (%)	129 (23.9)	410 (76.1)	539 (100.0)	5	31	575
6～ (%)	246 (23.0)	825 (77.0)	1,071 (100.0)	9	53	1,133
8～ (%)	231 (18.4)	1,027 (81.6)	1,258 (100.0)	11	80	1,349
10～ (%)	194 (18.9)	830 (81.1)	1,024 (100.0)	8	83	1,115
12～ (%)	111 (14.2)	669 (85.8)	780 (100.0)	3	65	848
14～ (%)	71 (15.9)	375 (84.1)	446 (100.0)	7	35	488
16～ (%)	44 (16.5)	223 (83.5)	267 (100.0)	4	24	295
合計 (%)	1,081 (19.5)	4,454 (80.5)	5,535 (100.0)	47	392	5,974
記載なし (%)	206 (32.0)	438 (68.0)	644 (100.0)	24	2,299	2,967
総計 (%)	1,287 (20.8)	4,892 (79.2)	6,179 (100.0)	71	2,691	8,941
平均	9.24	10.01	9.86	10.38	10.20	9.89
標準偏差	3.54	3.49	3.51	3.52	3.71	3.53

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査