

表 1561 降圧薬使用の有無 アルブミン濃度(g/dL)別（腹膜透析患者）

アルブミン 濃度	なし	あり	合計	不明	記載なし	総計
1.5未満 (%)	8 (72.7)	3 (27.3)	11 (100.0)		4	15
1.5～ (%)	27 (43.5)	35 (56.5)	62 (100.0)	2	7	71
2.0～ (%)	82 (29.8)	193 (70.2)	275 (100.0)	1	22	298
2.5～ (%)	212 (22.4)	736 (77.6)	948 (100.0)	10	79	1,037
3.0～ (%)	344 (17.2)	1,656 (82.8)	2,000 (100.0)	16	142	2,158
3.5～ (%)	319 (18.0)	1,458 (82.0)	1,777 (100.0)	14	115	1,906
4.0～ (%)	83 (20.7)	318 (79.3)	401 (100.0)	2	28	431
4.5～ (%)	4 (21.1)	15 (78.9)	19 (100.0)	1	1	21
5.0～ (%)		2 (100.0)	2 (100.0)			2
合計 (%)	1,079 (19.6)	4,416 (80.4)	5,495 (100.0)	46	398	5,939
記載なし (%)	208 (30.4)	476 (69.6)	684 (100.0)	25	2,293	3,002
総計 (%)	1,287 (20.8)	4,892 (79.2)	6,179 (100.0)	71	2,691	8,941
平均	3.21	3.30	3.28	3.22	3.21	3.28
標準偏差	0.60	0.49	0.52	0.59	0.55	0.52

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査