

表 1562 降圧薬使用の有無 CRP濃度(mg/dL)別（腹膜透析患者）

CRP濃度	なし	あり	合計	不明	記載なし	総計
0.2未満 (%)	492 (17.1)	2,385 (82.9)	2,877 (100.0)	20	170	3,067
0.2～ (%)	152 (16.8)	752 (83.2)	904 (100.0)	17	74	995
0.5～ (%)	97 (23.4)	317 (76.6)	414 (100.0)	3	32	449
1.0～ (%)	60 (21.4)	220 (78.6)	280 (100.0)	3	25	308
2.0～ (%)	53 (28.8)	131 (71.2)	184 (100.0)	2	16	202
4.0～ (%)	27 (35.5)	49 (64.5)	76 (100.0)	2	5	83
6.0～ (%)	9 (24.3)	28 (75.7)	37 (100.0)		3	40
8.0～ (%)	3 (13.0)	20 (87.0)	23 (100.0)		1	24
10.0～ (%)	11 (32.4)	23 (67.6)	34 (100.0)			34
15.0～ (%)	2 (28.6)	5 (71.4)	7 (100.0)			7
合計 (%)	906 (18.7)	3,930 (81.3)	4,836 (100.0)	47	326	5,209
記載なし (%)	381 (28.4)	962 (71.6)	1,343 (100.0)	24	2,365	3,732
総計 (%)	1,287 (20.8)	4,892 (79.2)	6,179 (100.0)	71	2,691	8,941
平均	0.86	0.58	0.63	0.58	0.58	0.63
標準偏差	2.06	1.66	1.75	1.20	1.14	1.71

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査