

表 1563 降圧薬使用の有無 補正カルシウム濃度(mg/dL)別（腹膜透析患者）

補正 カルシウム濃度	なし	あり	合計	不明	記載なし	総計
7.0未満 (%)	6 (20.7)	23 (79.3)	29 (100.0)			29
7.0～ (%)	4 (12.1)	29 (87.9)	33 (100.0)		3	36
7.5～ (%)	20 (16.9)	98 (83.1)	118 (100.0)		9	127
8.0～ (%)	42 (15.6)	228 (84.4)	270 (100.0)	1	15	286
8.4～ (%)	11 (14.1)	67 (85.9)	78 (100.0)	1	7	86
8.5～ (%)	136 (16.1)	708 (83.9)	844 (100.0)	3	59	906
9.0～ (%)	298 (20.2)	1,178 (79.8)	1,476 (100.0)	11	115	1,602
9.5～ (%)	303 (20.1)	1,202 (79.9)	1,505 (100.0)	19	105	1,629
10.0～ (%)	39 (22.0)	138 (78.0)	177 (100.0)		14	191
10.1～ (%)	92 (18.1)	416 (81.9)	508 (100.0)	6	43	557
10.5～ (%)	64 (23.4)	210 (76.6)	274 (100.0)	3	19	296
11.0～ (%)	37 (34.9)	69 (65.1)	106 (100.0)	1	4	111
11.5～ (%)	10 (35.7)	18 (64.3)	28 (100.0)	1		29
12.0～ (%)	10 (43.5)	13 (56.5)	23 (100.0)		4	27
合計 (%)	1,072 (19.6)	4,397 (80.4)	5,469 (100.0)	46	397	5,912
記載なし (%)	215 (30.3)	495 (69.7)	710 (100.0)	25	2,294	3,029
総計 (%)	1,287 (20.8)	4,892 (79.2)	6,179 (100.0)	71	2,691	8,941
平均	9.51	9.38	9.40	9.68	9.43	9.41
標準偏差	0.84	0.79	0.80	0.67	0.78	0.80

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査