

表 1564 降圧薬使用の有無 リン濃度(mg/dL)別（腹膜透析患者）

リン濃度	なし	あり	合計	不明	記載なし	総計
3未満	38	71	109	1	16	126
(%)	(34.9)	(65.1)	(100.0)			
3.0～	54	192	246	4	20	270
(%)	(22.0)	(78.0)	(100.0)			
3.5～	106	380	486	7	32	525
(%)	(21.8)	(78.2)	(100.0)			
4.0～	148	568	716	5	49	770
(%)	(20.7)	(79.3)	(100.0)			
4.5～	180	686	866	2	53	921
(%)	(20.8)	(79.2)	(100.0)			
5.0～	163	721	884	3	61	948
(%)	(18.4)	(81.6)	(100.0)			
5.5～	151	630	781	4	54	839
(%)	(19.3)	(80.7)	(100.0)			
6.0～	22	104	126	1	11	138
(%)	(17.5)	(82.5)	(100.0)			
6.1～	76	359	435	6	36	477
(%)	(17.5)	(82.5)	(100.0)			
6.5～	61	303	364	6	29	399
(%)	(16.8)	(83.2)	(100.0)			
7.0～	35	162	197	2	13	212
(%)	(17.8)	(82.2)	(100.0)			
7.5～	21	112	133	3	13	149
(%)	(15.8)	(84.2)	(100.0)			
8.0～	9	55	64	1	6	71
(%)	(14.1)	(85.9)	(100.0)			
8.5～	7	29	36		2	38
(%)	(19.4)	(80.6)	(100.0)			
9.0～	10	69	79	1	9	89
(%)	(12.7)	(87.3)	(100.0)			
合計	1,081	4,441	5,522	46	404	5,972
(%)	(19.6)	(80.4)	(100.0)			
記載なし	206	451	657	25	2,287	2,969
(%)	(31.4)	(68.6)	(100.0)			
総計	1,287	4,892	6,179	71	2,691	8,941
(%)	(20.8)	(79.2)	(100.0)			
平均	5.08	5.28	5.24	5.45	5.26	5.25
標準偏差	1.33	1.33	1.33	1.70	1.51	1.35

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査