

表 1565 降圧薬使用の有無 PTH値(pg/mL)別（腹膜透析患者）PTH測定法:intact-PTH

| PTH値        | なし            | あり              | 合計               | 不明     | 記載なし   | 総計     |
|-------------|---------------|-----------------|------------------|--------|--------|--------|
| 20未満<br>(%) | 24<br>(21.1)  | 90<br>(78.9)    | 114<br>(100.0)   |        | 9      | 123    |
| 20～<br>(%)  | 48<br>(18.5)  | 212<br>(81.5)   | 260<br>(100.0)   |        | 21     | 281    |
| 40～<br>(%)  | 47<br>(19.3)  | 196<br>(80.7)   | 243<br>(100.0)   | 2      | 23     | 268    |
| 60～<br>(%)  | 47<br>(16.2)  | 243<br>(83.8)   | 290<br>(100.0)   | 3      | 22     | 315    |
| 80～<br>(%)  | 51<br>(17.5)  | 240<br>(82.5)   | 291<br>(100.0)   | 3      | 15     | 309    |
| 100～<br>(%) | 56<br>(18.9)  | 241<br>(81.1)   | 297<br>(100.0)   | 1      | 18     | 316    |
| 120～<br>(%) | 70<br>(25.7)  | 202<br>(74.3)   | 272<br>(100.0)   | 5      | 28     | 305    |
| 140～<br>(%) | 54<br>(20.9)  | 204<br>(79.1)   | 258<br>(100.0)   | 6      | 21     | 285    |
| 160～<br>(%) | 48<br>(18.3)  | 215<br>(81.7)   | 263<br>(100.0)   |        | 13     | 276    |
| 180～<br>(%) | 113<br>(18.9) | 486<br>(81.1)   | 599<br>(100.0)   | 2      | 53     | 654    |
| 240～<br>(%) | 1<br>(10.0)   | 9<br>(90.0)     | 10<br>(100.0)    |        |        | 10     |
| 241～<br>(%) | 64<br>(15.9)  | 338<br>(84.1)   | 402<br>(100.0)   | 1      | 28     | 431    |
| 300～<br>(%) | 47<br>(15.5)  | 257<br>(84.5)   | 304<br>(100.0)   | 3      | 24     | 331    |
| 360～<br>(%) | 29<br>(16.2)  | 150<br>(83.8)   | 179<br>(100.0)   |        | 21     | 200    |
| 420～<br>(%) | 30<br>(23.1)  | 100<br>(76.9)   | 130<br>(100.0)   |        | 9      | 139    |
| 480～<br>(%) | 7<br>(17.9)   | 32<br>(82.1)    | 39<br>(100.0)    | 1      | 3      | 43     |
| 500～<br>(%) | 6<br>(12.2)   | 43<br>(87.8)    | 49<br>(100.0)    |        | 5      | 54     |
| 540～<br>(%) | 11<br>(15.7)  | 59<br>(84.3)    | 70<br>(100.0)    |        | 3      | 73     |
| 600～<br>(%) | 24<br>(24.0)  | 76<br>(76.0)    | 100<br>(100.0)   | 1      | 4      | 105    |
| 800～<br>(%) | 31<br>(31.6)  | 67<br>(68.4)    | 98<br>(100.0)    | 2      | 10     | 110    |
| 合計<br>(%)   | 808<br>(18.9) | 3,460<br>(81.1) | 4,268<br>(100.0) | 30     | 330    | 4,628  |
| 記載なし<br>(%) | 81<br>(25.9)  | 232<br>(74.1)   | 313<br>(100.0)   | 1      | 62     | 376    |
| 総計<br>(%)   | 889<br>(19.4) | 3,692<br>(80.6) | 4,581<br>(100.0) | 31     | 392    | 5,004  |
| 平均          | 240.66        | 219.23          | 223.29           | 226.53 | 231.27 | 223.88 |
| 標準偏差        | 288.27        | 204.90          | 223.21           | 221.00 | 298.29 | 229.31 |

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査