

表 1567 降圧薬使用の有無 ヘモグロビン濃度(g/dL)別（腹膜透析患者）

ヘモグロビン 濃度	なし	あり	合計	不明	記載なし	総計
5未満	1	6	7			7
(%)	(14.3)	(85.7)	(100.0)			
5～	4	8	12		2	14
(%)	(33.3)	(66.7)	(100.0)			
6～	8	19	27		1	28
(%)	(29.6)	(70.4)	(100.0)			
7～	26	80	106	1	17	124
(%)	(24.5)	(75.5)	(100.0)			
8～	57	250	307	6	31	344
(%)	(18.6)	(81.4)	(100.0)			
9～	150	688	838	8	57	903
(%)	(17.9)	(82.1)	(100.0)			
10～	261	1,311	1,572	13	121	1,706
(%)	(16.6)	(83.4)	(100.0)			
11～	330	1,266	1,596	9	104	1,709
(%)	(20.7)	(79.3)	(100.0)			
12～	167	571	738	10	48	796
(%)	(22.6)	(77.4)	(100.0)			
13～	55	165	220	1	16	237
(%)	(25.0)	(75.0)	(100.0)			
14～	17	57	74		5	79
(%)	(23.0)	(77.0)	(100.0)			
合計	1,076	4,421	5,497	48	402	5,947
(%)	(19.6)	(80.4)	(100.0)			
記載なし	211	471	682	23	2,289	2,994
(%)	(30.9)	(69.1)	(100.0)			
総計	1,287	4,892	6,179	71	2,691	8,941
(%)	(20.8)	(79.2)	(100.0)			
平均	10.91	10.80	10.82	10.60	10.67	10.81
標準偏差	1.50	1.39	1.41	1.37	1.48	1.42

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査