

表 1570 降圧薬使用の有無 Non-HDL-C濃度(mg/dL)別（腹膜透析患者）

Non-HDL-C濃度	なし	あり	合計	不明	記載なし	総計
50未満	2	15	17		1	18
(%)	(11.8)	(88.2)	(100.0)			
50～	18	84	102		12	114
(%)	(17.6)	(82.4)	(100.0)			
70～	50	266	316	2	33	351
(%)	(15.8)	(84.2)	(100.0)			
90～	110	508	618	5	37	660
(%)	(17.8)	(82.2)	(100.0)			
110～	125	611	736	3	58	797
(%)	(17.0)	(83.0)	(100.0)			
130～	125	489	614	3	45	662
(%)	(20.4)	(79.6)	(100.0)			
150～	79	321	400	5	31	436
(%)	(19.8)	(80.3)	(100.0)			
170～	50	196	246		17	263
(%)	(20.3)	(79.7)	(100.0)			
190～	23	88	111	1	8	120
(%)	(20.7)	(79.3)	(100.0)			
210～	17	65	82	1	7	90
(%)	(20.7)	(79.3)	(100.0)			
合計	599	2,643	3,242	20	249	3,511
(%)	(18.5)	(81.5)	(100.0)			
記載なし	688	2,249	2,937	51	2,442	5,430
(%)	(23.4)	(76.6)	(100.0)			
総計	1,287	4,892	6,179	71	2,691	8,941
(%)	(20.8)	(79.2)	(100.0)			
平均	131.62	127.89	128.58	134.90	126.53	128.47
標準偏差	38.97	37.52	37.81	46.73	39.89	38.01

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査