

表 1571 降圧薬使用の有無 収縮期血圧(mmHg)別（腹膜透析患者）

収縮期血圧	なし	あり	合計	不明	記載なし	総計
60未満	1		1			1
(%)	(100.0)		(100.0)			
60～	7	6	13			13
(%)	(53.8)	(46.2)	(100.0)			
80～	54	59	113		11	124
(%)	(47.8)	(52.2)	(100.0)			
100～	169	431	600	4	37	641
(%)	(28.2)	(71.8)	(100.0)			
120～	310	1,131	1,441	10	65	1,516
(%)	(21.5)	(78.5)	(100.0)			
140～	204	1,281	1,485	15	79	1,579
(%)	(13.7)	(86.3)	(100.0)			
160～	86	572	658	9	54	721
(%)	(13.1)	(86.9)	(100.0)			
180～	21	176	197	4	16	217
(%)	(10.7)	(89.3)	(100.0)			
200～	5	23	28		3	31
(%)	(17.9)	(82.1)	(100.0)			
220～	1	8	9		1	10
(%)	(11.1)	(88.9)	(100.0)			
合計	858	3,687	4,545	42	266	4,853
(%)	(18.9)	(81.1)	(100.0)			
記載なし	429	1,205	1,634	29	2,425	4,088
(%)	(26.3)	(73.7)	(100.0)			
総計	1,287	4,892	6,179	71	2,691	8,941
(%)	(20.8)	(79.2)	(100.0)			
平均	132.86	142.59	140.76	147.00	144.38	141.01
標準偏差	24.00	21.96	22.68	22.88	25.84	22.88

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査