

表 1572 降圧薬使用の有無 拡張期血圧(mmHg)別（腹膜透析患者）

拡張期血圧	なし	あり	合計	不明	記載なし	総計
20未満 (%)	1 (100.0)		1 (100.0)			1
20～ (%)	5 (33.3)	10 (66.7)	15 (100.0)			15
40～ (%)	95 (27.7)	248 (72.3)	343 (100.0)	4	28	375
60～ (%)	387 (19.9)	1,558 (80.1)	1,945 (100.0)	16	104	2,065
80～ (%)	214 (17.6)	1,004 (82.4)	1,218 (100.0)	9	69	1,296
90～ (%)	100 (15.1)	563 (84.9)	663 (100.0)	10	41	714
100～ (%)	50 (15.6)	271 (84.4)	321 (100.0)	3	23	347
120～ (%)	3 (17.6)	14 (82.4)	17 (100.0)		1	18
140～ (%)		1 (100.0)	1 (100.0)			1
合計 (%)	855 (18.9)	3,669 (81.1)	4,524 (100.0)	42	266	4,832
記載なし (%)	432 (26.1)	1,223 (73.9)	1,655 (100.0)	29	2,425	4,109
総計 (%)	1,287 (20.8)	4,892 (79.2)	6,179 (100.0)	71	2,691	8,941
平均	76.16	79.61	78.96	80.31	79.70	79.01
標準偏差	14.99	14.19	14.40	15.38	14.79	14.43

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査