

表 1573 降圧薬使用の有無 脈拍(拍/分)別 (腹膜透析患者)

脈拍	なし	あり	合計	不明	記載なし	総計
40未満 (%)		4 (100.0)	4 (100.0)		1	5
40～ (%)	3 (13.6)	19 (86.4)	22 (100.0)	1	2	25
50～ (%)	26 (14.9)	149 (85.1)	175 (100.0)	1	11	187
60～ (%)	138 (17.5)	651 (82.5)	789 (100.0)	4	57	850
70～ (%)	211 (17.8)	976 (82.2)	1,187 (100.0)	9	75	1,271
80～ (%)	164 (17.0)	802 (83.0)	966 (100.0)	1	57	1,024
90～ (%)	92 (20.5)	356 (79.5)	448 (100.0)	5	28	481
100～ (%)	45 (24.6)	138 (75.4)	183 (100.0)	3	18	204
110～ (%)	9 (18.4)	40 (81.6)	49 (100.0)		3	52
120～ (%)	5 (26.3)	14 (73.7)	19 (100.0)		1	20
合計 (%)	693 (18.0)	3,149 (82.0)	3,842 (100.0)	24	253	4,119
記載なし (%)	594 (25.4)	1,743 (74.6)	2,337 (100.0)	47	2,438	4,822
総計 (%)	1,287 (20.8)	4,892 (79.2)	6,179 (100.0)	71	2,691	8,941
平均	79.24	77.81	78.07	79.00	78.30	78.09
標準偏差	13.47	13.14	13.21	15.75	13.87	13.27

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査