

表 1575 喫煙の有無 治療方法(新分類)別(透析患者全体)

治療方法 (新分類)	現在吸っていない	現在吸っている	合計	不明	記載なし	総計
施設血液透析	160,903	22,107	183,010	13,698	58,933	255,641
(%)	(87.9)	(12.1)	(100.0)			
Off-line HDF	4,015	564	4,579	281	1,455	6,315
(%)	(87.7)	(12.3)	(100.0)			
On-line HDF	23,084	3,501	26,585	1,919	7,586	36,090
(%)	(86.8)	(13.2)	(100.0)			
Push/Pull HDF	251	49	300	68	169	537
(%)	(83.7)	(16.3)	(100.0)			
ハイオフィльтраーション	275	26	301	7	33	341
(%)	(91.4)	(8.6)	(100.0)			
血液濾過	25	4	29	3	60	92
(%)	(86.2)	(13.8)	(100.0)			
血液吸着透析 (リクセル)	1,158	112	1,270	97	256	1,623
(%)	(91.2)	(8.8)	(100.0)			
血液吸着透析 (その他)	5		5		2	7
(%)	(100.0)		(100.0)			
在宅血液透析	320	29	349	22	150	521
(%)	(91.7)	(8.3)	(100.0)			
腹膜透析 (CAPD)	2,582	246	2,828	354	1,839	5,021
(%)	(91.3)	(8.7)	(100.0)			
腹膜透析 (APD)	1,552	164	1,716	289	834	2,839
(%)	(90.4)	(9.6)	(100.0)			
腹膜透析 (CCPD)	610	74	684	91	306	1,081
(%)	(89.2)	(10.8)	(100.0)			
合計	194,780	26,876	221,656	16,829	71,623	310,108
(%)	(87.9)	(12.1)	(100.0)			
記載なし (%)						
総計	194,780	26,876	221,656	16,829	71,623	310,108
(%)	(87.9)	(12.1)	(100.0)			

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

\*腹膜透析(CCPD)は、APDと手動のバック交換の両方を行うもの

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査