

表 1580 喫煙の有無 原疾患別（透析患者全体）

原疾患	現在吸っていない	現在吸っている	合計	不明	記載なし	総計
慢性糸球体腎炎	62,104	7,421	69,525	5,304	22,141	96,970
(%)	(89.3)	(10.7)	(100.0)			
慢性腎盂腎炎	2,027	236	2,263	121	658	3,042
(%)	(89.6)	(10.4)	(100.0)			
急速進行性糸球体腎炎	1,629	180	1,809	111	574	2,494
(%)	(90.0)	(10.0)	(100.0)			
妊娠腎/妊娠中毒症	1,152	58	1,210	50	354	1,614
(%)	(95.2)	(4.8)	(100.0)			
その他の分類不能の腎炎	838	110	948	71	354	1,373
(%)	(88.4)	(11.6)	(100.0)			
多発性嚢胞腎	7,201	731	7,932	597	2,477	11,006
(%)	(90.8)	(9.2)	(100.0)			
腎硬化症	18,607	2,074	20,681	1,491	6,126	28,298
(%)	(90.0)	(10.0)	(100.0)			
悪性高血圧	1,533	310	1,843	126	604	2,573
(%)	(83.2)	(16.8)	(100.0)			
糖尿病性腎症	71,899	12,200	84,099	6,443	27,539	118,081
(%)	(85.5)	(14.5)	(100.0)			
SLE腎炎	1,432	157	1,589	139	508	2,236
(%)	(90.1)	(9.9)	(100.0)			
アミロイド腎	286	21	307	18	126	451
(%)	(93.2)	(6.8)	(100.0)			
痛風腎	694	143	837	57	219	1,113
(%)	(82.9)	(17.1)	(100.0)			
先天性代謝異常による腎不全	170	24	194	17	61	272
(%)	(87.6)	(12.4)	(100.0)			
腎・尿路結核	130	13	143	10	53	206
(%)	(90.9)	(9.1)	(100.0)			
腎・尿路結石	362	55	417	34	130	581
(%)	(86.8)	(13.2)	(100.0)			
腎・尿路腫瘍	558	70	628	50	208	886
(%)	(88.9)	(11.1)	(100.0)			
閉塞性尿路障害	475	69	544	28	151	723
(%)	(87.3)	(12.7)	(100.0)			
骨髄腫	185	14	199	15	62	276
(%)	(93.0)	(7.0)	(100.0)			
腎形成不全	425	60	485	31	133	649
(%)	(87.6)	(12.4)	(100.0)			
不明	17,047	2,134	19,181	1,548	6,815	27,544
(%)	(88.9)	(11.1)	(100.0)			
再導入	1,329	223	1,552	108	503	2,163
(%)	(85.6)	(14.4)	(100.0)			
その他	4,697	573	5,270	460	1,827	7,557
(%)	(89.1)	(10.9)	(100.0)			
合計	194,780	26,876	221,656	16,829	71,623	310,108
(%)	(87.9)	(12.1)	(100.0)			
記載なし						
(%)						
総計	194,780	26,876	221,656	16,829	71,623	310,108
(%)	(87.9)	(12.1)	(100.0)			

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査