

表 1586 喫煙の有無 Body Mass Index別（透析患者全体）

Body Mass Index	現在吸っていない	現在吸っている	合計	不明	記載なし	総計
14未満	1,187	78	1,265	81	240	1,586
(%)	(93.8)	(6.2)	(100.0)			
14～	6,908	544	7,452	435	1,303	9,190
(%)	(92.7)	(7.3)	(100.0)			
16～	22,267	2,200	24,467	1,440	4,316	30,223
(%)	(91.0)	(9.0)	(100.0)			
18～	38,543	4,784	43,327	2,807	7,723	53,857
(%)	(89.0)	(11.0)	(100.0)			
20～	42,259	5,909	48,168	3,168	8,584	59,920
(%)	(87.7)	(12.3)	(100.0)			
22～	32,256	4,883	37,139	2,570	6,712	46,421
(%)	(86.9)	(13.1)	(100.0)			
24～	19,184	3,241	22,425	1,573	3,968	27,966
(%)	(85.5)	(14.5)	(100.0)			
26～	9,954	1,942	11,896	885	2,148	14,929
(%)	(83.7)	(16.3)	(100.0)			
28～	5,211	1,007	6,218	423	1,075	7,716
(%)	(83.8)	(16.2)	(100.0)			
30～	4,355	984	5,339	393	879	6,611
(%)	(81.6)	(18.4)	(100.0)			
合計	182,124	25,572	207,696	13,775	36,948	258,419
(%)	(87.7)	(12.3)	(100.0)			
記載なし	12,656	1,304	13,960	3,054	34,675	51,689
(%)	(90.7)	(9.3)	(100.0)			
総計	194,780	26,876	221,656	16,829	71,623	310,108
(%)	(87.9)	(12.1)	(100.0)			
平均	21.40	22.20	21.50	21.71	21.48	21.51
標準偏差	3.64	3.74	3.66	3.67	3.63	3.66

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査