

表 1588 喫煙の有無 透析前アルブミン濃度(g/dL)別(透析患者全体)

透析前アルブミン濃度	現在吸っていない	現在吸っている	合計	不明	記載なし	総計
1.5未満 (%)	130 (92.2)	11 (7.8)	141 (100.0)	17	27	185
1.5～ (%)	716 (92.9)	55 (7.1)	771 (100.0)	60	158	989
2.0～ (%)	3,025 (94.7)	169 (5.3)	3,194 (100.0)	267	600	4,061
2.5～ (%)	11,248 (93.0)	849 (7.0)	12,097 (100.0)	913	2,426	15,436
3.0～ (%)	46,731 (90.2)	5,083 (9.8)	51,814 (100.0)	3,682	10,612	66,108
3.5～ (%)	92,216 (87.2)	13,545 (12.8)	105,761 (100.0)	7,710	21,764	135,235
4.0～ (%)	33,222 (84.5)	6,072 (15.5)	39,294 (100.0)	2,838	8,376	50,508
4.5～ (%)	1,900 (82.8)	395 (17.2)	2,295 (100.0)	120	499	2,914
5.0～ (%)	150 (86.2)	24 (13.8)	174 (100.0)	7	22	203
合計 (%)	189,338 (87.8)	26,203 (12.2)	215,541 (100.0)	15,614	44,484	275,639
記載なし (%)	5,442 (89.0)	673 (11.0)	6,115 (100.0)	1,215	27,139	34,469
総計 (%)	194,780 (87.9)	26,876 (12.1)	221,656 (100.0)	16,829	71,623	310,108
平均	3.58	3.69	3.60	3.59	3.60	3.60
標準偏差	0.45	0.40	0.44	0.45	0.44	0.44

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査