

表 1589 喫煙の有無 透析前CRP濃度(mg/dL)別 (透析患者全体)

透析前CRP濃度	現在吸っていない	現在吸っている	合計	不明	記載なし	総計
0.2未満 (%)	93,226 (87.5)	13,308 (12.5)	106,534 (100.0)	7,841	20,934	135,309
0.2～ (%)	30,769 (87.1)	4,560 (12.9)	35,329 (100.0)	2,722	6,756	44,807
0.5～ (%)	15,570 (87.5)	2,227 (12.5)	17,797 (100.0)	1,357	3,603	22,757
1.0～ (%)	10,325 (89.1)	1,258 (10.9)	11,583 (100.0)	951	2,214	14,748
2.0～ (%)	6,305 (89.6)	731 (10.4)	7,036 (100.0)	594	1,375	9,005
4.0～ (%)	2,273 (90.5)	239 (9.5)	2,512 (100.0)	226	506	3,244
6.0～ (%)	1,108 (91.0)	109 (9.0)	1,217 (100.0)	99	260	1,576
8.0～ (%)	604 (92.5)	49 (7.5)	653 (100.0)	66	151	870
10.0～ (%)	730 (92.4)	60 (7.6)	790 (100.0)	88	156	1,034
15.0～ (%)	475 (89.1)	58 (10.9)	533 (100.0)	55	105	693
合計 (%)	161,385 (87.7)	22,599 (12.3)	183,984 (100.0)	13,999	36,060	234,043
記載なし (%)	33,395 (88.6)	4,277 (11.4)	37,672 (100.0)	2,830	35,563	76,065
総計 (%)	194,780 (87.9)	26,876 (12.1)	221,656 (100.0)	16,829	71,623	310,108
平均	0.64	0.54	0.63	0.72	0.63	0.63
標準偏差	1.94	1.81	1.93	2.24	1.76	1.92

数値下の括弧内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査