

表 1590 喫煙の有無 透析前補正カルシウム濃度(mg/dL)別 (透析患者全体)

透析前補正 カルシウム濃度	現在吸っていない	現在吸っている	合計	不明	記載なし	総計
7.0未満 (%)	721 (85.2)	125 (14.8)	846 (100.0)	141	155	1,142
7.0～ (%)	1,084 (84.2)	203 (15.8)	1,287 (100.0)	97	265	1,649
7.5～ (%)	4,173 (85.2)	724 (14.8)	4,897 (100.0)	398	1,104	6,399
8.0～ (%)	13,603 (86.0)	2,215 (14.0)	15,818 (100.0)	1,223	3,398	20,439
8.4～ (%)	4,013 (86.9)	605 (13.1)	4,618 (100.0)	335	919	5,872
8.5～ (%)	45,530 (87.1)	6,736 (12.9)	52,266 (100.0)	3,885	11,168	67,319
9.0～ (%)	56,537 (87.8)	7,840 (12.2)	64,377 (100.0)	4,564	13,063	82,004
9.5～ (%)	37,717 (88.7)	4,799 (11.3)	42,516 (100.0)	2,935	8,518	53,969
10.0～ (%)	4,587 (88.3)	609 (11.7)	5,196 (100.0)	389	1,013	6,598
10.1～ (%)	11,952 (89.6)	1,391 (10.4)	13,343 (100.0)	952	2,682	16,977
10.5～ (%)	5,942 (90.5)	625 (9.5)	6,567 (100.0)	421	1,282	8,270
11.0～ (%)	2,025 (91.2)	195 (8.8)	2,220 (100.0)	139	422	2,781
11.5～ (%)	684 (89.8)	78 (10.2)	762 (100.0)	62	149	973
12.0～ (%)	512 (95.0)	27 (5.0)	539 (100.0)	39	103	681
合計 (%)	189,080 (87.8)	26,172 (12.2)	215,252 (100.0)	15,580	44,241	275,073
記載なし (%)	5,700 (89.0)	704 (11.0)	6,404 (100.0)	1,249	27,382	35,035
総計 (%)	194,780 (87.9)	26,876 (12.1)	221,656 (100.0)	16,829	71,623	310,108
平均	9.20	9.12	9.19	9.15	9.17	9.19
標準偏差	0.74	0.72	0.74	0.80	0.74	0.74

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査