

表 1591 喫煙の有無 透析前リン濃度(mg/dL)別 (透析患者全体)

透析前リン濃度	現在吸っていない	現在吸っている	合計	不明	記載なし	総計
3未満 (%)	7,877 (92.7)	620 (7.3)	8,497 (100.0)	560	1,829	10,886
3.0～ (%)	9,613 (90.4)	1,016 (9.6)	10,629 (100.0)	672	2,281	13,582
3.5～ (%)	16,633 (89.8)	1,896 (10.2)	18,529 (100.0)	1,318	3,835	23,682
4.0～ (%)	24,512 (88.9)	3,046 (11.1)	27,558 (100.0)	2,017	5,707	35,282
4.5～ (%)	29,281 (88.8)	3,690 (11.2)	32,971 (100.0)	2,392	6,696	42,059
5.0～ (%)	29,366 (88.1)	3,957 (11.9)	33,323 (100.0)	2,399	6,996	42,718
5.5～ (%)	25,196 (87.7)	3,520 (12.3)	28,716 (100.0)	2,091	5,898	36,705
6.0～ (%)	4,274 (87.5)	608 (12.5)	4,882 (100.0)	340	1,039	6,261
6.1～ (%)	14,125 (86.4)	2,226 (13.6)	16,351 (100.0)	1,245	3,513	21,109
6.5～ (%)	12,193 (85.9)	2,003 (14.1)	14,196 (100.0)	1,076	3,006	18,278
7.0～ (%)	7,358 (84.4)	1,357 (15.6)	8,715 (100.0)	726	1,836	11,277
7.5～ (%)	4,456 (83.0)	910 (17.0)	5,366 (100.0)	401	1,091	6,858
8.0～ (%)	2,586 (81.7)	579 (18.3)	3,165 (100.0)	261	627	4,053
8.5～ (%)	1,607 (79.9)	404 (20.1)	2,011 (100.0)	155	406	2,572
9.0～ (%)	2,425 (77.3)	712 (22.7)	3,137 (100.0)	259	681	4,077
合計 (%)	191,502 (87.8)	26,544 (12.2)	218,046 (100.0)	15,912	45,441	279,399
記載なし (%)	3,278 (90.8)	332 (9.2)	3,610 (100.0)	917	26,182	30,709
総計 (%)	194,780 (87.9)	26,876 (12.1)	221,656 (100.0)	16,829	71,623	310,108
平均	5.17	5.49	5.21	5.27	5.21	5.21
標準偏差	1.40	1.52	1.42	1.44	1.44	1.43

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査