

表 1593 喫煙の有無 PTH値(pg/mL)別（透析患者全体）PTH測定法:whole-PTH

PTH値	現在吸っていない	現在吸っている	合計	不明	記載なし	総計
20未満	1,445	174	1,619	81	194	1,894
(%)	(89.3)	(10.7)	(100.0)			
20～	1,749	210	1,959	98	274	2,331
(%)	(89.3)	(10.7)	(100.0)			
35～	1,539	195	1,734	84	225	2,043
(%)	(88.8)	(11.2)	(100.0)			
50～	2,327	322	2,649	140	364	3,153
(%)	(87.8)	(12.2)	(100.0)			
75～	2,003	286	2,289	122	337	2,748
(%)	(87.5)	(12.5)	(100.0)			
100～	1,680	228	1,908	126	264	2,298
(%)	(88.1)	(11.9)	(100.0)			
125～	1,071	159	1,230	90	219	1,539
(%)	(87.1)	(12.9)	(100.0)			
150～	28	7	35	5	8	48
(%)	(80.0)	(20.0)	(100.0)			
151～	905	129	1,034	67	162	1,263
(%)	(87.5)	(12.5)	(100.0)			
180～	645	84	729	53	93	875
(%)	(88.5)	(11.5)	(100.0)			
210～	430	64	494	54	80	628
(%)	(87.0)	(13.0)	(100.0)			
240～	452	79	531	51	92	674
(%)	(85.1)	(14.9)	(100.0)			
300～	188	32	220	27	37	284
(%)	(85.5)	(14.5)	(100.0)			
350～	137	14	151	7	21	179
(%)	(90.7)	(9.3)	(100.0)			
400～	138	21	159	19	24	202
(%)	(86.8)	(13.2)	(100.0)			
500～	166	25	191	24	32	247
(%)	(86.9)	(13.1)	(100.0)			
合計	14,903	2,029	16,932	1,048	2,426	20,406
(%)	(88.0)	(12.0)	(100.0)			
記載なし	351	36	387	20	250	657
(%)	(90.7)	(9.3)	(100.0)			
総計	15,254	2,065	17,319	1,068	2,676	21,063
(%)	(88.1)	(11.9)	(100.0)			
平均	105.16	110.33	105.78	131.42	113.42	108.01
標準偏差	110.48	107.17	110.10	134.82	128.86	114.01

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査