

表 1595 喫煙の有無 総コレステロール濃度(mg/dL)別（透析患者全体）

総コレステロール濃度	現在吸っていない	現在吸っている	合計	不明	記載なし	総計
100未満 (%)	5,333 (86.6)	827 (13.4)	6,160 (100.0)	464	1,206	7,830
100～ (%)	15,283 (85.8)	2,519 (14.2)	17,802 (100.0)	1,287	3,633	22,722
120～ (%)	28,692 (86.5)	4,477 (13.5)	33,169 (100.0)	2,331	6,701	42,201
140～ (%)	33,364 (87.2)	4,911 (12.8)	38,275 (100.0)	2,729	7,655	48,659
160～ (%)	27,957 (88.1)	3,782 (11.9)	31,739 (100.0)	2,208	6,296	40,243
180～ (%)	17,874 (89.0)	2,205 (11.0)	20,079 (100.0)	1,383	4,063	25,525
200～ (%)	9,637 (89.7)	1,111 (10.3)	10,748 (100.0)	769	2,206	13,723
220～ (%)	4,269 (90.6)	444 (9.4)	4,713 (100.0)	341	1,017	6,071
240～ (%)	1,699 (89.7)	195 (10.3)	1,894 (100.0)	135	371	2,400
260～ (%)	1,081 (90.5)	113 (9.5)	1,194 (100.0)	98	294	1,586
合計 (%)	145,189 (87.6)	20,584 (12.4)	165,773 (100.0)	11,745	33,442	210,960
記載なし (%)	49,591 (88.7)	6,292 (11.3)	55,883 (100.0)	5,084	38,181	99,148
総計 (%)	194,780 (87.9)	26,876 (12.1)	221,656 (100.0)	16,829	71,623	310,108
平均	156.29	152.31	155.80	155.69	156.22	155.86
標準偏差	35.76	34.39	35.61	36.17	36.18	35.74

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査